

do alcance de crianças e animais domésticos.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**

**BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

**SUÍNOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

**Responsável Técnica:**

Sandra Barioni Toma  
CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 8.440 em 13/01/2003.

**Apresentações:**

Frascos de polietileno contendo 250 mL, 1L, 5 L, 10L e 20 L.



**Proprietário e fabricante:**  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298  
CEP: 14140-000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.com  
Indústria brasileira

**100% brasileira, exportadora, gerando empregos no Brasil.**



5078014/0911/0551

# Colosso Pour On

Uso Veterinário

Ectoparasiticida de ampla ação

**Fórmula:**

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina.....5,0 g  
Clorpirifós.....7,0 g  
Citronelal.....0,5 g  
Veículo q.s.p. ....100,0 mL

Sarnas (*Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Psoroptes natalensis*, *Chorioptes bovis*).

**Suínos**

Sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*).

Moscas (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Dermatobia hominis*).

**Modo de uso e dosagem:**

**Bovinos:**

A dosagem recomendada é de 10 mL para cada 100 kg de peso corporal, obedecendo à tabela abaixo:

Peso	Dose
100 kg.....	10 mL
200 kg.....	20 mL
300 kg.....	30 mL
400 kg.....	40 mL
500 kg.....	50 mL

Para animais acima de 500 kg de peso corporal, a dose máxima recomendada é de 50 mL.

**Indicações:**

**Colosso Pour On** é um produto indicado para uso dorsal sobre a pele do animal, no combate dos seguintes ectoparasitas que acometem:

**Bovinos**

Carrapatos (*Boophilus microplus*, *Amblyomma cajennensis*, *Anocentor nitens*).

Berne, ou larvas de *Dermatobia hominis*.

Moscas (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Dermatobia hominis*, *Musca autumnalis*).

Piolhos (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*).

O produto deve ser aplicado em toda linha dorsal do animal, da inserção da cauda até o meio do pescoço.

**Suínos:**

A dosagem recomendada é de 5 mL para cada 100 kg de peso corporal, obedecendo à tabela abaixo:

Peso	Dose
50 kg.....	2,5 mL
100 kg .....	5,0 mL
150 kg.....	7,5 mL
200 kg.....	10,0 mL
250 kg.....	12,5 mL
300 kg.....	15,0 mL

O produto deve ser aplicado em toda linha dorsal do animal, da inserção da cauda até o meio do pescoço.

**Intervalo entre doses:**

A frequência do tratamento dependerá da infestação e do manejo integral da praga, baseado no limiar de infestação e dinâmica populacional.

**Contraindicações e limitações de uso:**

Não aplicar em animais

extremamente debilitados. Não aplicar em pele lesionada. Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos compostos do produto. Não aplicar em animais recém-nascidos. Não aplicar o produto nas horas de calor muito intenso.

**Precauções:**

Evitar a aplicação em animais debilitados, exaustos ou estressados. Não aplicar o produto nas horas de calor muito intenso. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo antes de comer e de beber e após o trabalho com o produto. Não fumar quando estiver trabalhando com o produto. Conservar o produto em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não contaminar rios e outros cursos de água. Produto tóxico para peixes.

Se o produto atingir os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante durante 15 minutos. Se ocorrer intoxicação acidental proceder da seguinte maneira: Retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Procurar atendimento médico.

**Interações**

**medicamentosas:**

Inibidores da oxidase de função mista [p.ex. butóxido de piperonila e N-octil-bicicloheptano dicarboxilamida (MGK-264)] suprimem a hidrólise de piretrinas e piretrides, potencializando sua atividade. Fármacos que ativam os receptores colinérgicos, relaxantes musculares periféricos e organoclorados devem ser evitados quando se fizer uso de organofosforados. Os tranquilizantes fenotiazônicos aumentam a toxicidade dos organofosforados. A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares

podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

**Reações adversas:**

Os piretroides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos. Geralmente são seguros, mas eventualmente podem causar alergia, náusea, vômito e cefaleia.

Os organofosforados podem ocasionar efeitos adversos como salivação, lacrimejamento, micção, defecação, dispneia, fasciculação, ataxia e convulsões (em casos de má administração de doses ou intoxicações acidentais).

**Informações para uso médico:**

Cipermetrina: é um piretroide e não possui antídoto específico. Fazer tratamento sintomático. Clorpirifós: é um organofosforado, cujo antídoto é o sulfato de atropina.

Conservar em local seco e fresco, entre 5° e 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora