

Trigental

USO VETERINÁRIO

(**enrofloxacino a 5%**)

ANTIDIARREICO EM PASTA DE USO ORAL

FÓRMULA: Cada 100 g contém:

Enrofloxacino 5,00 g

Excipienteq.s.p. 100,00 g

INDICAÇÕES: Para tratamento das enterites (diarreias) dos:

Bovinos: causadas por **Salmonella spp** e **Escherichia coli**.

Suínos: causadas por **Salmonella spp** e **Escherichia coli**.

MODO DE USAR: Via oral, diretamente sobre a língua dos animais.

Bovinos: 5 gramas de Trigental para 100 kg de peso, o que corresponde a 2,5 mg de enrofloxacino por kg de peso corpóreo.

Suínos: 5 gramas de Trigental para 100 kg de peso, o que corresponde a 2,5 mg de enrofloxacino por kg de peso corpóreo.

Essas doses devem ser aplicadas a cada 24 horas ou a critério do Médico Veterinário.

Não interromper o tratamento antes de decorridas, pelo menos, 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

EFEITOS COLATERAIS: Podem ocorrer urticária e prurido em animais hipersensíveis às quinolonas e erosões das cartilagens nos animais jovens em fase de crescimento.

Restrições: Não usar em bezerros destinados a vitelo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não administrar o produto juntamente com medicamentos contendo magnésio, zinco, cálcio e ferro, pois eles reduzem a absorção das quinolonas. Não associar o uso do produto com alcalinizantes urinários (bicarbonato de sódio, citratos ou inibidores da anidrase carbônica), pois podem causar nefrotoxicidade, apesar de serem raras. Antagonismo com tetraciclina e sulfas + trimetoprim.

CONTRAINDICAÇÕES: Na gestação, lactação e na insuficiência renal grave.

PERÍODO DE CARÊNCIA

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

SUÍNOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PRAZO DE VALIDADE: 02 (dois) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO: seringa plástica descartável dosadora contendo 40 g.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 4703 em 17/06/94.

Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421

Monte Mor /SP - CEP 13190-000

CNPJ 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408 - www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Data da Revisão:

Aprovação TRIGENTAL

Departamento	Assinatura	Data	NÃO	SIM
Comercial				
Garantia de Qualidade				
Marketing				
Compras				
Produção				
Regulatório				