

**DESFLAN**  
**OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.**

**Fórmula:**

Cada 100 ml contém:

Flunixinina (meqglumina) ..... 5,0 g

Veículo q.s.p. .... 100,0 ml

**Indicações:**

DESFLAN é um potente analgésico, não narcótico, não esteróidico, com atividade antiinflamatória e antipirética, recomendado para todos os casos de dor, febre e/ou inflamação para bovinos e eqüinos.

**Dosagem:**

**Eqüinos:**

**- Desordens músculo-esqueléticas:**

Administrar 1 mL para cada 45 kg de peso corporal (1,1 mg/kg), uma vez ao dia, por até 5 dias.

**- Alívio da dor associada a cólicas:**

Administrar 1 mL para cada 45 kg de peso corporal (1,1 mg/kg). Neste caso, recomenda-se a aplicação intravenosa para pronta ação do DESFLAN, que pode ocorrer dentro de 15 minutos ou menos. O tratamento pode ser repetido se reaparecerem sinais de cólicas.

A causa da cólica deve ser determinada e tratada concomitantemente com a terapêutica indicada para a mesma.

**- Choque endotóxico:**

Administrar 1 mL para cada 45 kg de peso corporal (1,1 mg/kg), pela via intravenosa.

**Bovinos:**

**- Diarréia dos recém-nascidos:**

Administrar 2-3 mL para cada 45 kg de peso corporal (2,2 a 3,3 mg/kg), pela via intramuscular ou intravenosa. Geralmente uma única aplicação é efetiva.

**- Mastite colibacilar ou choque endotóxico:**

Administrar 1 mL para cada 45 kg de peso corporal (1,1 mg/kg), pela via intravenosa. Continuar o tratamento por 3 dias, na mesma dosagem, utilizando a via intramuscular.

**- Desordens músculo-esqueléticas:**

Administrar 1 mL para cada 45 kg de peso corporal (1,1 mg/kg), uma vez ao dia, por até 5 dias, utilizando a via intramuscular ou intravenosa.

Para outras indicações, utilizar 2 mL de DESFLAN (2,2 mg/kg) para cada 45 kg de peso corporal, uma vez ao dia, por até 5 dias.

**Administração:**

DESFLAN deve ser administrado pelas vias intramuscular ou intravenosa.

**Precauções:**

Obedecer rigorosamente as indicações e as dosagens para a aplicação do produto.

Deve-se tomar cuidado para evitar a aplicação intra-arterial.

Não associar ou usar concomitantemente com outros antiinflamatórios não esteróides (AINEs), glicocorticóides e diuréticos.

A superdosagem do produto pode causar depressão do sistema nervoso central, diarréias, insuficiências renais agudas, distúrbios hematológicos, indiferença e anorexia.

Não utilizar em touros reprodutores.

Obedecer às dosagens indicadas para o uso do produto.

Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas.

**Período de carência:**

Bovinos:

Carne: Não destinar ao consumo humano, a carne dos animais tratados, antes de transcorridos 10 dias após a última aplicação do produto.

Eqüinos: não usar em eqüinos cuja carne seja destinada ao consumo humano.

Não utilizar em bezerros destinados à vitela.

Não usar em vacas leiteiras em lactação ou secas.

Conservar em local seco e fresco, entre 5° C a 30° C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

**Apresentação:**

Frasco-ampola de vidro incolor com 10 e 50 ml.

**Classe Terapêutica:**

ANTI-INFLAMATÓRIOS, ANTI-PIRÉTICOS, ANTI-ALÉRGICOS E ANALGÉSICOS

**Princípio(s) Ativo(s):**

FLUNIXIN

**Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:**

7.845/01

**Responsável Técnico:**

Sandra Barioni - CRMV: SP 14.817

**Serviço de Atendimento ao Consumidor:**

0800 9412000